

Budapestre vonatkozó újságcikkek

Szerző:

Kovács Ildikó

Cím:

Egészségügyi meghívók
Segített a Leningrád 16.

Forrás:

Népművelés

(Hely)

1971.08.31.

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Osztályozás

Tárgy

614.522

Hely

Idő

01971

Személy

Helyszám

Egészségügyi meghívók

Segített a Leningrád 16.

Társai: Szeptember 7-én országsszerte megkezdődött a kanyaró elleni védőoltás. Az akció október 9-ig tart. Először azokat a gyerekeket oltják be, akik 1970-ben születtek és a betegségén még nem estek át, azután azokra kerül sor, akik 1969-ben és 1968-ban születtek, de valamilyen oknál fogva nem kapták meg annak idején a szérumot. Az oltás kötelező.

Ma már természetes, hogy, ilyenkor őszel hivatalos értesítést kapnak a szülők: hová és mikor vigyék el kicsinyeiket a kanyaró elleni kötelező védőoltásra. De néhány évvel ezelőtt még mindez korántsem volt magától értetődő.

A statisztika biztató

Egészségügyi kormányzatunk 1969-ben vette fel a kötelezők közé ezt a védőoltást. A kanyaró eddig a legveszélyesebb fertőző betegség volt, mert gyakran járt szövődésmennyel. S azzal, hogy évről évre egyre több kisgyermek kerülhetett bölcsődébe, óvodába, megnőtt a veszélye annak, hogy az apróságok igen korán — a velük született immunitás kialakása után —, egy-két éves korukban kapják meg ezt a betegséget.

A kanyaró, amíg nem tudtunk ellene hatéko-

nyan védekezni, több halálos megbetegedést okozott, mint az összes fertőző gyermekbetegség együttvéve. Csak néhány kiragadott példa a statisztikából: a 60-as évek elején 100 halálos kimenetelű kanyaró fordult elő, 1969-ben 29, 1970-ben az első félévben kettő. S ez utóbbi alacsony szám már a kísérleti és az 1969-es oltások következménye volt. Az orvosok szerint a legveszélyeztetettebb az 1-6 éves korosztály. Tíz éven felül ritka a kanyaró és érdekes, hogy a csecsemők — különösen az anyatejesekek — sem kapják meg.

Leküzdhetjük a kanyarót

Járványos években a kanyarós esetek száma országosan 50 000 körül mozgott. 1970-ben a fővárosban — ilyen még nem volt — mindössze 720 beteget jelentettek. Tavaly egyébként januártól szeptemberig országosan 6576 kanyaró fordult elő — az előző tíz év átlaga viszont 38 000 volt. 1971-ben ugyanezen időszakban alig több mint 3000 gyermek volt kanyarós.

Közegészségügyi szakemberek szerint az eddigi eredmények, a statisztikák alapján, rendkívül

biztatóak. Azt a jogos reményt keltheti bennünk, hogy ezt a veszedelmes fertőző betegséget is — a gyermekbénuláshoz hasonlóan — végleg leküzdhetjük.

Akiknek köszönhetjük

A kanyaró elleni aktív védőoltás bevezetéséig a védekezés egyetlen módja gamma globulinnal való passzív védőoltás volt. Ennek azonban mindössze annyi volt a hatása — persze, az adott esetben ez is sokat számított —, hogy enyhítette a betegség lefolyását, vagy jobb esetben a gyermek megbetegedését egy későbbi időpontra toltta el. (A nálunk használt szérum a Szovjetunióban gyártott Leningrád 16. jelzésű törzsből származott.)

Ezekben a napokban tehát sok családhoz becsenget a postás az egészségügyi meghívóval. Az aprócska szúrás biztosan sok kis száját elgörbit majd, s miközben vigasztaljuk őket — talán egy pillanatra azokra is gondolunk, akinek gyermekeink egészségét köszönhetjük.

Kovács Ildikó