



# Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Szerző: .....

Cím: *Budapestben a 11-14 éves gyermekek 83%-a reagál a tuberkulinra*

Forrás: .....

*Magyarország*

*Bp*

(Hely)

*1922. 11. 23.*

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Osztályozás

Tárgy

*614.542*

Hely

Idő

*"1922"*

Személy

## Budapestben a 11—14 éves gyermekek 83%-a reagál tuberkulinra

„A gümőkór az igazi belső ellenségünk.” — Végre kell hajtani az 1912. évi belügyminiszteri rendeletet! — Megdöbbenően nagy a tanárok, tanítók, tanítónők halálozási arányszáma. Országh Oszkár dr. mai előadása a gyermekkor tuberkulózisáról

(A Magyarország tudósítójától.) Az Országos Közegészségügyi Egyesület népszerű előadássorozatát indította meg, amelynek keretében minden szerdán délután hat órai kezdettel meghívott szakemberek ismertetnek általános érdekű egészségügyi kérdéseket a Közegészségtani Intézet előadótermében. Az első előadáson Deseő Dezső dr. főiskolai segéd-tanár a táplálkozás higiénéjével foglalkozott.

Ma délutáni ülésén Országh Oszkár dr., az Erzsébet Királyné Szanatórium főorvosa nálunk szomorúan aktuális kérdéssről,

„A gyermekkor tuberkulózisáról”

tart előadást. A kérdés közérdekű voltára való tekintettel munkatársunk felkereste

Országh Oszkár dr.-t,

aki felolvasása tárgyát a következőkben ismertette a nagyközönség számára:

— Mai előadásom célja az, hogy hangsúlyozzam a tuberkulózis ellen folytatott küzdelem fontosságát, mert kétségtelen, hogy ennek a küzdelemnek eredményes folytatása Magyarország létérdeke. Statisztikai adatok alapján bebizonyítható, hogy

a gümőkór az igazi belső ellenségünk.

1919-ben 10.000 lélekre 33.04 halálozás esett. A gyermekhalandóság látszólag esőkként éspedig azért, mert a háborúban apadt a születések száma. Így ebből egyáltalában nem lehet arra következtetni, hogy a gümőkóros megbetegedés tekintetében az általános helyzet javult. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy az idősebb gyermekeknél a gümőkór pusztítása növekedett, 1917 óta Budapest főváros halálozási statisztikája határozott javulást mutat, Kérdéses azonban az, hogy a javulás a rossz lakás és megélhetési vi-

szonyok között tartós lesz-e.

A gyermek minden esetben tuberkulózistól menten születik.

A fertőzést a beteg családtagok, a háztartási alkalmazottak, ismerősök, a tanítók, a tehéntej és a fertőzött lakás pora s levegője okozhatja. Eddigi vizsgálataim igazolták, hogy minél idősebb a gyermek, annál nagyobb százalékban fertőzött, bár betegnek még nem mondható. Heim és John adatai szerint

Budapestben a 11—14 éves gyermekek 83%-a reagál tuberkulinra.

Kedvezőtlen életkörülmények azután kifejlesztik a lappangó betegséget. Minthogy tehát a fertőzés főleg a gyermekkorban jön létre, a felnőttek gümőkórja ellen folytatott küzdelemnek a gyermekek megóvásával kell kezdődnie.

— A gyermeket már az iskolában meg kell tanítanunk, hogyan védekezzen a betegség ellen. Ezért nagyon kívánatos, hogy már a népiskolákban népszerű, gyakorlati egészségügyi tanítsanak.

Nagyfontosságú volna az 1912. évi belügyminiszteri rendelet végrehajtása

amely a lakásfertőtlenítést rendeli el és az ételmiszer előállításával foglalkozó munkások valamint az ételmiszerkereskedők orvosi ellenőrzését kívánja. A szülők tuberkulotikus betegsége esetén a gyermeket feltétlenül el kell különíteni. Az elkülönítés elmulasztása adja főképp magyarázatát az alábbi statisztikának:

minél nagyobb valamely foglalkozási ágban a szülők halálozási arányszáma, annál nagyobb a gyermekeiké is.

— A hét éven aluli gyermekek halálozási átlaga

2,78%; a borbélyok, takácsok, kocsmárosok gyermekei 5,07—5,20%; a nyomdászok gyermekei pedig 4,65%. A háztartási alkalmazottak halálozási arányszáma az átlagnak több mint kétszerese. Eppen ezért feltétlenül szükséges az, hogy őket orvosilag ellenőrizzék, különösen ott, ahol gyermekek vannak. Egyenesen megdöbbentő az a körülmény, hogy

az apácák, tanítónők, tanítók, tanárok halálozási arányszáma rendkívül nagy.

Gyermekeink érdekében szükséges tehát az, hogy az oktató személyzetet fokozott orvosi ellenőrzésnek vessék alá és megélhetésük biztosításán kívül anyagi jólétükről gondoskodjanak.

— Részletesen foglalkozom a tej-megjavításának, a lakások tisztántartásának szükségességével és ismertetem azokat a módszereket, amelyekkel a gyermekek ellenálló képessége erősen fokozható.

— A már beteg gyermekek gyógyítására a sanatóriumokat tartom a legalkalmasabbnak, a sanatóriumi kezelés azonban, sajnos, a mai nehéz viszonyok között nem valósítható meg minden esetben. Az üdülőtelepek, nappali fekvőcsarnokok és

napküröző helyek megvalósítása, azonkívül a Balaton partvidékének intenzívebb kihasználása útköznek a legkevesebb nehézségbe. Az állam feladata lenne elsősorban az, hogy a gümőkór gyógyításának ezeket az intézményeit megvalósítsa, de a mai nehéz helyzetben kell hogy a társadalom is megtegye a maga kötelességét.